

សៀវភៅផ្តល់ព័ត៌មាន និងជម្រើសពីមធ្យោបាយពន្យារកំណើត

សម្រាប់អ្នកផ្តល់សេវា










តារាងកូដព័ណ៌ គឺមានភាពងាយស្រួល និងឆាប់រហ័សសម្រាប់មើលការប្រៀបធៀបពីអត្ថប្រយោជន៍នៃមធ្យោបាយពន្យារកំណើតនីមួយៗ។


ជួយអតិថិជនក្នុងការស្វែងយល់ពីអត្ថប្រយោជន៍ នៃមធ្យោបាយពន្យារកំណើតនីមួយៗ។

សារគន្លឹះសំខាន់និងការណែនាំនៃជម្រើសមធ្យោបាយពន្យារកំណើត ដើម្បីបង្កើននូវការពេញចិត្ត និងការយល់ស្របរបស់អតិថិជន។

**សូមបញ្ជាក់ប្រាប់
អតិថិជនថា
អ្វីដែលគាត់ប្រាប់អ្នក
គឺរក្សាការសម្ងាត់**



វិធីសាស្ត្រ	 មធ្យោបាយ បញ្ឈប់កំណើត	 កងដាក់ ប្រកាមស្បែក	 កងដាក់ ក្នុងស្បែក	 ថ្នាំចាក់ ពន្យារកំណើត	 ថ្នាំគ្រាប់ ពន្យារកំណើត	 គ្រឿង អនាម័យ	 ថ្នាំគ្រាប់ការពារ កំណើតបន្ទាន់
ការពារការមានផ្ទៃពោះ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
មានផ្ទៃពោះវិញបន្ទាប់ពីឈប់ប្រើ	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ភាពជាឯកជន	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
ការពារការឆ្លងរោគអេដស៍ និងជំងឺកាមរោគ	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
មានផលរំខានតិចតួច	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
មានរដូវតិច	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✗
ងាយស្រួលប្រើ	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓
ងាយស្រួលចាប់ផ្តើម និងឈប់ប្រើ	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ចំណាយថវិកាតិច	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
គុណ្ណៈ	✓	ល្អណាស់សម្រាប់ អ្នកដែលចង់បាន	✓	ល្អសម្រាប់ អ្នកដែលចង់បាន	✗	មិនល្អសម្រាប់ អ្នកដែលចង់បាន	



ស្វាគមន៍	<ul style="list-style-type: none"> • សួស្តី ខ្ញុំឈ្មោះ :..... តើអ្នកឈ្មោះអ្វី? • អ្វីៗដែលអ្នកបានប្រាប់ខ្ញុំ នឹងត្រូវបានរក្សាការសម្ងាត់
ការសាកសួរ	<ul style="list-style-type: none"> • តើអ្នកមានការអ្វីថ្ងៃនេះ? • តើអ្នកធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការប្រើមធ្យោបាយពន្យារកំណើតដែរឬទេ? • តើអ្វីជាត្រូវបានបញ្ជាក់អ្នក? • តើអ្នកមានបានគិតថា ចូលចិត្តមធ្យោបាយពន្យារកំណើតណាមួយក្នុងចិត្តហើយឬនៅ?
ការនិយាយប្រាប់	<ul style="list-style-type: none"> • ការផ្លាស់ប្តូរឈាមរដូវ គឺធម្មតា (ធម្មតា ឱកាសវិលត្រឡប់មធ្យោបាយ បាត់រដូវ កំណត់: NORMAL)។ • និយាយប្រាប់អតិថិជនពីមធ្យោបាយពន្យារកំណើត២ទៅ៣មុខដែលឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការ ឬ បញ្ជាក់បន្ថែមពីមធ្យោបាយដែលអតិថិជនបានគិតចង់ប្រើក្នុងចិត្តហើយ។
ការជួយ	<ul style="list-style-type: none"> • ជួយធ្វើការប្រៀបធៀបមធ្យោបាយពន្យារកំណើត ២ ទៅ ៣ មុខតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ឬបញ្ជាក់បន្ថែមពីមធ្យោបាយដែលអតិថិជនបានជ្រើសរើសថា ប្រើក្នុងចិត្តហើយ។ • វាយតម្លៃសាកសួរ និងពិនិត្យលក្ខខណ្ឌវេជ្ជសាស្ត្រអតិថិជនសម្រាប់មធ្យោបាយពន្យារកំណើតដែលបានជ្រើសរើស។ • សូមឲ្យនាងសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសមធ្យោបាយណាមួយដែលសមស្របសម្រាប់នាង។
ការពន្យល់	<ul style="list-style-type: none"> • ពន្យល់អំពី (3w) ចំណុចពីមធ្យោបាយពន្យារកំណើតដែលនាងជ្រើសរើស និងឲ្យនាងនិយាយសារឡើងវិញ។ • ធ្វើផែនការជាមួយគ្នាសម្រាប់របៀបប្រើ និងអ្វីដែលត្រូវធ្វើប្រសិនបើមានផលរំខានកើតមានឡើង។
ការវិលត្រឡប់	<ul style="list-style-type: none"> • ត្រឡប់មកវិញគ្រប់ពេល បើអ្នកមានសំណួរ ឬកង្វល់។

គន្លឹះ	
	ល្អណាស់សម្រាប់អ្នកដែលចង់បាន
	ល្អសម្រាប់អ្នកដែលចង់បាន
	មិនល្អសម្រាប់អ្នកដែលចង់បាន

ធម្មតា ឱកាស វិលត្រឡប់ មធ្យោបាយ បាត់រដូវ កំណត់: **NORMAL**

ធម្មតា (Normal)

ឱកាស (Opportunities)

វិលត្រឡប់ (Return)

មធ្យោបាយ (Methods)

បាត់រដូវ (Absence of period)

កំណត់ (Limit)

ការពារការមានផ្ទៃពោះ

មានប្រសិទ្ធភាពជាង



ប្រសិទ្ធភាពតិចជាង



មិនមានអ្នកជំងឺ
តែអ្នកផ្តល់
លេវ៉ាជីង



ផ្តល់នូវការពារការឆ្លងមេរោគ
អេដស៍ និងជំងឺកាមរោគផ្សេងទៀត

ដែលគួរអាចមានអារម្មណ៍
ប៉ះខ្សែ តែអត់មានអ្នកណា
នឹងជំងឺ



អ្នកខ្លះអាចស្លាប់ដឹង
រឺប្រសិនបើជំងឺកន្លែងដែល
ត្រូវស្លាប់



អ្នកខ្លះអាចឃើញកញ្ចប់ថ្នាំ



អ្នកខ្លះមើលឃើញ និង
មានការសហការពីដៃគូ



មិនអាចការពារការឆ្លង
មេរោគអេដស៍ និងជំងឺ
កាមរោគ។ អ្នកត្រូវប្រើ
បូកូមជាមួយនឹងស្រោម
អនាម័យ ប្រសិនបើអ្នកចង់
ការពារខ្លួនពីការឆ្លងមេរោគ
អេដស៍ និងជំងឺកាមរោគ។



មិនអាចការពារការឆ្លងមេរោគអេដស៍ និងជំងឺកាមរោគ
ប្រសិនបើដៃគូរបស់អ្នកមានផ្ទៃកាមរោគអេដស៍ អ្នកអាច
មានការប្រឈមខ្ពស់ក្នុងការក្លាយជាអ្នកផ្ទុកមេរោគ
អេដស៍។ សំខាន់ណាស់ត្រូវប្រើបូកូមជាមួយនឹងស្រោម
អនាម័យ។



មានជម្រើសខ្លះតិចតួច



• គ្មាន

មិនមាន
ផលរំខាន



• ប្រែប្រួលរង្វង់។ នៅក្នុងពេលកំពុងដាក់កង ប្រើខ្លះបានបទពិសោធន៍លើពោះ។



• ប្រែប្រួលរង្វង់។ អ្នកប្រើខ្លះប្រាប់ផែនលំខានមានដូចជា ឈឺក្បាល ឈឺពោះ ដោះឡើងតឹង។ ជាញឹកញយវាផលរំខានបាត់ទៅវិញនៅក្នុងកំឡុងពេលណាមួយ។



• អ្នកប្រើខ្លះអាចជួបផលរំខានដូចជា ឈឺក្បាល រំលងមុខ ដោះឡើងតឹង ប្រែប្រួលអារម្មណ៍។ ជាញឹកញយវាផលរំខានបាត់ទៅវិញនៅក្នុងកំឡុងពេលណាមួយ។



• អាចបណ្តាលឲ្យឈឺក្រពះនិងក្អក។ ផលរំខានទាំងអស់នឹងបាត់ទៅវិញក៏ឡងពេល២៤ម៉ោង ក្រោយពេលលេបថ្នាំការពារកំណើតបន្ទាន់។ រង្វង់ប្រហែលជាអាចមកចៀន ឬយឺត និងមានឆ្លាក់ហាយមតិច្បាច់នោះរង្វង់។



• ប្រែប្រួលរង្វង់។ អ្នកប្រើខ្លះឡើងទំងន់ ឈឺក្បាល និងរំលងមុខ។

មាសជូតិប

មធ្យោបាយពន្យារកំណើតភាគច្រើន គឺធ្វើឲ្យអ្នកមានការប្រែប្រួល សូមពិនិត្យមើល **NORMAL** នៅទំព័របន្ទាប់ទៀត។ ការផ្លាស់ប្តូរគឺវាខុសគ្នាពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ ការរៀបរយនេះតែងតែផ្តល់ប្រទះចំពោះមធ្យោបាយពន្យារកំណើតនីមួយៗ។ បទពិសោធន៍នៃការផ្លាស់ប្តូរ វាមានភាពខុសគ្នាដូចដែលបានរៀបរាប់ដូចខាងក្រោមនេះ មិនមែនមានន័យថា មធ្យោបាយពន្យារកំណើតមិនមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេ។

មិនមានផ្លូវ



មានផ្លូវដូចការរំពឹងទុក

- ពិជំរុំអ្នកប្រើប្រាស់ខ្លះអាចនឹងមានឆ្នាក់លមាមតិចៗ ចន្លោះរដូវបន្ទាប់មកយំពោះតិចៗ។ ប្រសិនបើប្រើថ្នាំគ្រាប់បានត្រឹមត្រូវ និងទៀងទាត់នោះ អាចមានរដូវដូចការរំពឹងទុក។



មិនមានការប្រែប្រួល



- អ្នកប្រើប្រាស់ខ្លះមានរដូវច្រើនជាងមុនបន្តិចជាមួយនិងកាលឈើពោះ ជាពិសេសនៅពេលប្រើរយៈពេលច្រើន។ ពេលដំបូង។

រដូវច្រើនជាងមុន

មិនមានផ្លូវ



មករដូវមិនដូចការរំពឹងទុក



- ពិជំរុំអ្នកប្រើប្រាស់ខ្លះអាចមានមករដូវមិនដូចការរំពឹងទុកនិងពេលខ្លះយូរថ្ងៃ។ បន្ទាប់មកអ្នកប្រើប្រាស់ភាគច្រើនគឺគ្មានរដូវ និងឈឺពោះតិចៗ។



- អ្នកប្រើភាគច្រើនមានឆ្នាក់លមាមតិចៗចន្លោះរដូវ ឈឺពោះតិចៗនិងមករដូវមិនដូចការរំពឹងទុក។ អ្នកប្រើខ្លះមិនមានរដូវ។ បន្ទាប់មកលទ្ធភាពនៃការមិនមានរដូវកើនឡើង។



- បន្ទាប់ពីលេបថ្នាំគ្រាប់ការពារកំណើតបន្ទាន់ លមាមរដូវអាចឆ្លាក់ឆាប់ ឬយឺត និងមានឆ្នាក់លមាមតិចៗចន្លោះរដូវ។ ការប្រើថ្នាំគ្រាប់ការពារកំណើតបន្ទាន់ ត្រូវនិយាយជាមួយបេក្ខឲ្យមានរដូវមិនដូចការរំពឹងទុក។

គ្មានការផ្លាស់ប្តូរ

សារគន្លឹះជ្រើសរើសអតិថិជនដែលប្រើ មធ្យោបាយពន្យារកំណើតដែលមានជាតិអ៊ីយ៉ូន

ប្រើប្រាស់ការមេកេដូរ គឺ **NORMAL**


ស្រ្តីភាគច្រើនមានការយល់ច្រឡំពីការប្រើប្រាស់ផ្លូវនៅពេលប្រើមធ្យោបាយពន្យារកំណើត តើដែលមានជាតិអ៊ីយ៉ូន។

ប្រើខួបការណ៍នេះ ជួយឲ្យអតិថិជនបានស្វែងរកព័ត៌មានប្រើប្រាស់ការមេកេដូរ នៅពេលដែលពួកគេប្រើមធ្យោបាយពន្យារ

កំណើតដែលមានជាតិអ៊ីយ៉ូន(១) គឺ **NORMAL**។ ផ្តល់ព័ត៌មានភ្ជាប់ជាមួយអាសូកាដងអ៊ីមធ្យោបាយជាតំណាងមួយដែលឆ្លងប្រើប្រាស់ការមេក

ដេដូរ។ បន្ថែមលើនោះទៀត ការផ្តល់ប្រើប្រាស់យល់និយម។ ជ្រើសរើសព័ត៌មានប្រើប្រាស់ការមេកេដូរ និងព័ត៌មានពីអត្ថប្រយោជន៍ពីការកាត់បន្ថយការមេកេដូរ និង

ការណ៍យល់ច្រឡំ។ សូមប្រើការ **NORMAL** ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចម្រង់នេះជាមួយពួកគាត់។



NORMAL

NORMAL (ធម្មតា) ៖ ប្រើប្រាស់ការមេកេដូរស្រ្តីស្រីស្រី គឺធម្មតា ពេលដែលអ្នកប្រើមធ្យោបាយពន្យារកំណើត។ រដូវអាចមកច្រើន ឬតិចជាងមុន។ ពេលខ្លះរដូវមិនដូចកាលពីមុនក៏ ឬពេលខ្លះមិនមានរដូវតែម្តង។ ការប្រើប្រាស់បែបនេះ វានឹងខុសគ្នាពីខ្លះ ទៅខ្លះ (២) ។

OPPORTUNITIES (ឱកាស) ៖ ការមេកេដូរកិច្ច ឬគ្មានអាចផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់សុខភាព និងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ស្រ្តី។

RETURN (ត្រឡប់) ៖ ពេលដែលអ្នកយល់ប្រើមធ្យោបាយពន្យារកំណើត រដូវរបស់អ្នកនឹងត្រឡប់មកដូចដើមវិញ ហើយក៏ជាឱកាសនៃការត្រឡប់ទៅការមានផ្ទៃពោះឡើងវិញ (៣) ។

METHODS (វិធីសាស្ត្រ) ៖ មធ្យោបាយពន្យារកំណើតផ្សេងទៀត អាចឲ្យមានការប្រើប្រាស់ផ្លូវផ្សេងៗដទៃ។ សូមឲ្យអ្នកផ្តល់សេវាប្រាប់អ្នកព្រឹក្សាទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកអាចទទួលបាន។

ABSENCE OF MENSES (មិនមានរដូវ) ៖ ការមិនមានរដូវមិនមានន័យថា អ្នកមានផ្ទៃពោះទេ។ ប្រសិនបើអ្នកមានសញ្ញាថាមានផ្ទៃពោះ ចូរចុះបញ្ជីកម្មវិធី ឬប្រើខួបការណ៍ពិនិត្យទឹកនោម (៤) ។

LIMIT (កម្រិត) ៖ ប្រសិនបើការប្រើប្រាស់ផ្លូវនេះមានការមិនត្រឹមត្រូវ គឺមានផលស្រ្តីស្រីស្រីមធ្យោបាយពន្យារកំណើត។

សូមប្រាប់អ្នកផ្តល់សេវាពីរឿងនេះ។

* សារគន្លឹះដែលមាននៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចណែនាំនេះ គឺទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយពន្យារកំណើតដែលមានជាតិអ៊ីយ៉ូន។ សារគន្លឹះនេះ មិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់ឡើយ ប្រសិនបើលក់មធ្យោបាយពន្យារកំណើតក្នុងស្រុក។

២ បន្ថែមលើចំណុចទាំងដប់នេះ សូមផ្តល់ព័ត៌មានអំពីផលប្រយោជន៍ និងព័ត៌មានអំពីការប្រើប្រាស់ផ្លូវ ទាំងមុននឹង

ប្រើប្រាស់ផ្លូវដែលផ្តល់ជូនដោយមធ្យោបាយពន្យារកំណើត។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយ អ្នកអាចទាក់ទងសេវាពេទ្យដែលជួយប្រើប្រាស់ផ្លូវបាន។ ខ្មោចប្រាណៈ (DMPA) អាចមាននៅពេលដែលអ្នកត្រូវប្រើប្រាស់មធ្យោបាយពន្យារកំណើតផ្សេងទៀតអាចនឹងស្របចំមធ្យោបាយពន្យារកំណើតផ្សេងទៀតអាចនឹងមានក្នុងជួរជួបប្រជុំរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយ អ្នកអាចទាក់ទងសេវាពេទ្យដែលជួយប្រើប្រាស់ផ្លូវបាន។

ព័ត៌មាន ទៅដល់ស្រ្តីដែលកំពុងប្រើប្រាស់ប្រើប្រាស់មធ្យោបាយពន្យារកំណើតឲ្យបានដឹងថា ការមិនមករដូវជាសញ្ញាគ្មានទាន់ផ្ទៃពោះ។ ការមិនមករដូវនេះនឹងបង្កឱ្យមានការប្រើប្រាស់ផ្លូវកំណើតផ្សេងទៀតផ្សេងៗទៀត។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយ អ្នកអាចទាក់ទងសេវាពេទ្យដែលជួយប្រើប្រាស់ផ្លូវបាន។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយ អ្នកអាចទាក់ទងសេវាពេទ្យដែលជួយប្រើប្រាស់ផ្លូវបាន។

Developed in collaboration with FHI 360

ងាយស្រួលប្រើ / ចាប់ផ្តើម / ឈប់ប្រើ

ងាយស្រួលប្រើ

ដួបអ្នកផ្តល់សេវា ១ ឬ ២ ដង



ដួបអ្នកផ្តល់សេវា ជាផ្សំរាល់១ខែ ទៅ ៣ខែ



ប្រើរាល់ពេលឆ្លងកាត



ប្រើផ្សំរាល់ថ្ងៃ



ងាយស្រួលចាប់ផ្តើម / ឈប់ប្រើ

អាចរកបាននៅឱសថស្ថាន/អ្នកផ្សព្វផ្សាយ
តាមសហគមន៍ និងឈប់ប្រើបានគ្រប់ពេលវេលា



ផ្តល់ដោយអ្នកផ្តល់សេវា បើចង់ឈប់ប្រើនៅពេលណា ត្រូវត្រឡប់ទៅកន្លែងទទួលសេវាវិញ



ផ្តល់ដោយអ្នកផ្តល់សេវា។
ឈប់បានរយៈពេល៣ខែ
ចុងក្រោយបន្ទាប់ពីការចាក់ថ្នាំ



ដួបអ្នកផ្តល់សេវានៅពេល
ចាប់ផ្តើមប្រើ។ មិនអាច
ស្រាយ និងកញ្ជាប់ដូចដើមវិញ។

ចំណាយថវិកាតិច

ភាពញឹកញាប់នៃការចំណាយ

ម្តង



ពីរដង (ពេលដាក់ និងដក)



រៀងរាល់ ១ ម៉ោង ៣ ខែ



រៀងរាល់ពេលចូរមកទ



គណនាជាមួយគ្នាអំពីការចំណាយរៀបនឹងពេលវេលានិង អាស្រ័យលើរយៈពេលដែលអ្នកចង់បានការពារ។ សូមពិចារណាទាំងអស់គ្នា ពីពេលវេលា និងការចំណាយសម្រាប់ធ្វើដំណើរទៅជួបគ្រូពេទ្យម្តងៗ។

មធ្យោបាយបញ្ឈប់កំណើត



<p>ល្អណាស់សម្រាប់អ្នកដែលចង់បាន៖</p>	នឹងគ្មានកូនជាងរៀងរហូត
	ងាយស្រួលប្រើ
	ភាពជាឯកជន
	ចំណាយថវិកាតិចតួច
	មានផលរំខានតិចតួច
<p>មិនល្អសម្រាប់អ្នកដែលចង់បាន៖</p>	ត្រូវឱ្យបំបែកមានកូនវិញ (មិនអាចស្រាយ និងតភ្ជាប់ឱ្យដូចដើមវិញ)
	ងាយស្រួលចាប់ផ្តើម/ឈប់ប្រើ
	មានរដូវចតឹច
	ការពារការឆ្លងមេរោគអេដស៍ និងជំងឺកាមរោគ

បន្ទាប់ពីបានប្រើមធ្យោបាយបញ្ឈប់កំណើត ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ងាយស្រួល!

<p>ជាដម្រើសល្អណាស់ប្រសិនបើអ្នក៖</p>	បញ្ឈប់ការមានកូន
<p>មិនល្អសម្រាប់អ្នកប្រសិនបើ៖</p>	ចង់បានកូនបន្ថែម ទៀតនៅពេលអនាគត



មធ្យោបាយបញ្ឈប់កំណើត

សារគន្លឹះសំខាន់មុនពេលជ្រើសរើស៖

- ✓ អាចប្រើបានទាំងបុរស ឬ ស្ត្រី។
- ✓ អ្នកផ្តល់សេវានឹងប្រើប្រាស់ថ្នាំស្តីក ដូច្នោះអ្នកនឹងមិនមានការឈឺចាប់កំឡុងពេលដំណើរការ។
- ✓ មិនមានការផ្លាស់ប្តូរសមត្ថភាពផ្លូវភេទរបស់អ្នក។
- ✓ មធ្យោបាយបញ្ឈប់កំណើត មិនអាចត្រឡប់មកមានផ្ទៃពោះវិញទេ។ អ្នកអាចប្រើប្រសិនបើប្រាកដថា មិនចង់បានកូនទៀតទេ។

ប្រសិនបើស្ត្រីចង់បានមធ្យោបាយបញ្ឈប់កំណើត ធ្វើការបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យដែលមានសេវានេះ

កងដាក់ក្រោមស្បែក



ល្អណាស់សម្រាប់អ្នកដែលចង់បាន៖

១ដើមការពារមិនឲ្យមានផ្ទៃពោះបានរហូតដល់៣ឆ្នាំ

២ដើមការពារមិនឲ្យមានផ្ទៃពោះបានរហូតដល់៥ឆ្នាំ

អាចមានកូនក្រោយពីដកកងក្រោមស្បែកចេញ

ងាយស្រួលប្រើ

ចំណាយថវិកាតិចតួច

ល្អសម្រាប់អ្នកដែលចង់បាន៖

ភាពជាឯកជន

ងាយស្រួលចាប់ផ្តើម / ឈប់ប្រើមានរដូវតិច

មានផលរំខានតិចតួច

មិនល្អសម្រាប់អ្នកដែលចង់បាន៖

ការពារការឆ្លងមេរោគអេដស៍ និងជំងឺកាមរោគ

កងដាក់ក្រោមស្បែកធ្វើឲ្យខ្ញុំ អស់ក្តីបារម្ភ!



ជាជម្រើសល្អណាស់ប្រសិនបើអ្នក៖

ចង់រស់នៅដោយសេរីដោយមិនចាំបាច់ចង់ចាំនូវការប្រើរៀងរាល់ថ្ងៃ

មិនល្អសម្រាប់អ្នកប្រសិនបើ៖

មានរដូវទៀងទាត់ដូចការរំពឹងទុកដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នក

កងដាក់ក្រោមស្បែក

សារគន្លឹះសំខាន់មុនពេលជ្រើសរើស៖

- ✓ អ្នកផ្តល់សេវានឹងធ្វើឲ្យស្លឹកនៅត្រង់កន្លែងដែលត្រូវដាក់បញ្ចូលកង ក្រោមស្បែក បន្ទាប់មកបញ្ចូលកងចូលទៅក្រោមស្បែកនៃដើមដៃរបស់អ្នករយៈពេល២ទៅ៣នាទី។
- ✓ អ្នកអាចត្រឡប់មកវិញ ប្រសិនបើចង់ដកកងក្រោមស្បែកចេញនៅពេលណាក៏បាន ជាមួយហេតុផលអ្វីក៏ដោយ។ អាចមានកូនក្រោយពីដកកងក្រោមស្បែកចេញ។
- ✓ រំលឹកឡើងវិញ **NORMAL**

ប្រសិនបើស្រ្តីកំពុងប្រើឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ *efavirenz or nevirapine* ប្រាប់ឲ្យនាងដឹងអំពីអន្តរកម្មថ្នាំ ដែលអាចមាន និងការកាត់បន្ថយតិចតួចនៃប្រសិទ្ធភាពពន្យារកំណើត។

3Ws: ឲ្យអតិថិជននិយាយសារឡើងវិញមុនពេលចេញទៅផ្ទះ

តើអ្វីដែលត្រូវធ្វើ?	<ul style="list-style-type: none"> • ប្រើស្រោមអនាម័យ៧ថ្ងៃ ប្រសិនបើគាត់មិនបានដាក់កងក្រោមស្បែកក្នុងចន្លោះពីថ្ងៃទី១ ដល់ទី៧ នៃវដ្តឈាមរដូវ • ថែរក្សាដៃដែលដាក់កងឲ្យស្អាត និងស្ងួតរហូតដល់ជាសះស្បើយ • ជៀសវាងការលើករបស់ធ្ងន់ៗដោយដៃដែលដាក់កងក្នុងរយៈពេល២ថ្ងៃ
អ្វីខ្លះដែលរំពឹងទុកថានឹងអាចកើតមានឡើង	<ul style="list-style-type: none"> • ប្រែប្រួលវគ្គឈាមរដូវ អាចមានឈាមរដូវមិនទៀងទាត់ ពន្យារពេលវគ្គឈាមរដូវ អត់មានឈាមរដូវ
ពេលណាត្រូវត្រឡប់មកវិញ	<ul style="list-style-type: none"> • ពេលដែលអ្នកចង់សាកសួរសំណួរ មានការព្រួយបារម្ភ ឬចង់ផ្លាស់ប្តូរមធ្យោបាយពន្យារកំណើត • គ្រប់ពេលដែលអ្នកចង់ដកកងចេញ • ពី៣ ទៅ ៥ឆ្នាំ ដើម្បីដាក់កងក្រោមស្បែកថ្មីជំនួស

ការចងចាំ :

- ✓ ប្រសិនបើមិនអាចកំណត់បានថាស្រ្តីអត់មានផ្ទៃពោះទេ ផ្តល់មធ្យោបាយពន្យារកំណើត និងណាត់ជួប៤សប្តាហ៍ក្រោយ
- ✓ ធ្វើការវាយតម្លៃសាកសួរ និងពិនិត្យលក្ខខណ្ឌវដ្តសាស្ត្រអតិថិជន

ការធ្វើផែនការ :

- តើនាងនឹងគួរចងចាំរបៀបណាដើម្បីឲ្យដឹងថា ដល់ពេលមកប្តូរកងថ្មី?
- តើនាងគួរធ្វើដូចម្តេចដើម្បីធានាថា បានរៀបចំសម្រាប់ការធ្លាក់ឈាមដែលមិន បានរំពឹងទុក

កងដាក់ក្នុងស្បូន



<p>ល្អណាស់សម្រាប់អ្នកដែលចង់បាន៖</p>	<p>ការពារមិនឲ្យមានផ្ទៃពោះរយៈពេល១០ឆ្នាំ</p> <p>អាចមានកូនភ្លាមក្រោយដកកងចេញ</p> <p>ងាយស្រួលប្រើ</p> <p>ចំណាយថវិកាតិចតួច</p> <p>មានផលរំខានតិចតួច</p>
<p>ល្អសម្រាប់អ្នកដែលចង់បាន៖</p>	<p>ភាពជាឯកជន</p> <p>ងាយស្រួលចាប់ផ្តើម / ឈប់ប្រើ</p>
<p>មិនល្អសម្រាប់អ្នកដែលចង់បាន៖</p>	<p>ការពារការឆ្លងមេរោគអេដស៍ និងជំងឺកាមរោគ</p> <p>មានរដូវតិច</p>

កងដាក់ក្នុងស្បូនធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចធម្មជាតិ!



<p>ជាជម្រើសល្អណាស់ប្រសិនបើអ្នក៖</p> <p>មិនល្អសម្រាប់អ្នកប្រសិនបើ៖</p>	<p>ចង់បានរដូវមកទៀងទាត់</p> <p>រដូវរបស់អ្នកច្រើននិងឈឺពោះ</p>
---	---

កងដាក់ក្នុងស្បៀង

សារគន្លឹះសំខាន់មុនពេលជ្រើសរើស៖

- ✓ អ្នកផ្តល់សេវានឹងបញ្ចូលកងដាក់ក្នុងស្បៀងទៅក្នុងស្បៀងតាមរយៈទ្វារមាស។ អ្នកអាចមានអារម្មណ៍ឈឺពោះនៅក្នុងពេលដំណើរការ និងឈឺពោះពីរទៅបីថ្ងៃ បន្ទាប់ពីការដាក់កង។
- ✓ អ្នកអាចត្រឡប់មកវិញ ប្រសិនបើចង់ដកកងដាក់ក្នុងស្បៀងចេញពេលណាក៏បានជាមួយហេតុផលអ្វីក៏ដោយ។ អាចមានកូនវិញភ្លាមបន្ទាប់ពីដកកងចេញ។

3Ws: ឲ្យអតិថិជននិយាយសារឡើងវិញមុនពេលចេញទៅផ្ទះ :

តើអ្វីដែលត្រូវធ្វើ?	<ul style="list-style-type: none"> • គ្មាន
អ្វីខ្លះដែលរំពឹងទុកថានឹងអាចកើតមានឡើង	<ul style="list-style-type: none"> • មានការឈឺចាប់តិចតួចក្នុងកំឡុងពេល២ ទៅ ៣ថ្ងៃ • មានការប្រែប្រួលការធ្លាក់ឈាមរដូវ ពិសេសពី៣ទៅ៦ខែដំបូង • អាចមានឈាមរដូវយូរ ឬមានឈាមរដូវមិនទៀងទាត់ឈាមរដូវនឹងមកទៀងទាត់វិញពេលក្រោយ មានឈាមរដូវច្រើនជាងមុន ឬឈឺចាប់ពេលមានឈាមរដូវ
ពេលណាត្រូវត្រឡប់មកវិញ	<ul style="list-style-type: none"> • ក្នុងកំឡុង៤ ទៅ ៦សប្តាហ៍ដើម្បីពិនិត្យតាមដាន • ពេលដែលអ្នកចង់សាកសួរសំណួរ មានការព្រួយ បារម្ភ ឬចង់ផ្លាស់ប្តូរមធ្យោបាយពន្យារកំណើតផ្សេងទៀត • គ្រប់ពេលដែលអ្នកចង់ដកកងចេញ • ១០ ឆ្នាំ ដើម្បីដាក់កងថ្មីជំនួស • បញ្ហាទាក់ទងនឹងការធ្លាក់ឈាមរដូវ • ប្រសិនបើឈឺពោះផ្នែកខាងក្រោមខ្លាំងឡើងៗ ឬឈឺពេលរួមភេទ • មានធ្លាក់សមិនធម្មតា • មានគ្រុនក្តៅ ញាក់ ឬចង់ក្អកចង្ការ • ប្រសិនបើអ្នកគិតថាអ្នកមានផ្ទៃពោះ ឬមានសញ្ញាសង្ស័យថាមានផ្ទៃពោះ • មានបញ្ហាខ្សែកង បាត់ខ្សែកង ខ្សែកងរឹងពេក ឬខ្លីពេក

ការចងចាំ :

- ✓ ផ្ទៀងផ្ទាត់ការមើលការមានផ្ទៃពោះ
- ✓ ធ្វើការវាយតម្លៃសាកសួរ និងពិនិត្យលក្ខខណ្ឌវេជ្ជសាស្ត្រអតិថិជន

ការធ្វើផែនការ :

- តើនាងនឹងធ្វើដូចម្តេចប្រសិនបើមានការធ្លាក់ឈាមរដូវយូរ ?
- នាងត្រូវរៀបចំបែបណាសម្រាប់ការហូរឈាម មិនបានរំពឹងទុក ?

ថ្នាំចាក់ពន្យារកំណើត



<p>ល្អណាស់សម្រាប់អ្នកដែលចង់បាន៖</p>	<p>ការពារមិនឲ្យមានផ្ទៃពោះបាន៣ខែ (ចាក់រៀងរាល់៣ខែម្តង)</p> <p>ភាពជាឯកជន</p>
<p>ល្អសម្រាប់អ្នកដែលចង់បាន៖</p>	<p>មានផ្ទៃពោះវិញ បន្ទាប់ពីឈប់ប្រើងាយស្រួលចាប់ផ្តើម / ឈប់ប្រើចំណាយថវិកាតិច</p> <p>មានរដូវតិច</p> <p>មានផលរំខានតិចតួច</p>
<p>មិនល្អសម្រាប់អ្នកដែលចង់បាន៖</p>	<p>ការពារការឆ្លងមេរោគអេដស៍ និងជំងឺកាមរោគ</p> <p>មានផលរំខានតិច</p>

ថ្នាំចាក់ពន្យារកំណើត ជួយខ្ញុំរក្សាការសម្ងាត់!

<p>ជាជម្រើសល្អណាស់ប្រសិនបើអ្នក៖</p>	<p>មិនចង់ឲ្យអ្នកណាម្នាក់ដឹងថាអ្នកកំពុងប្រើថ្នាំចាក់ពន្យារកំណើត</p>
<p>មិនល្អសម្រាប់អ្នកប្រសិនបើ៖</p>	<p>អ្នកចង់មាន រដូវ ទៀងទាត់ ឬចង់មានផ្ទៃពោះ៦ខែក្រោយ</p>

ថ្នាំចាក់ពន្យារកំណើត

សារគន្លឹះសំខាន់មុនពេលជ្រើសរើស៖

- ✓ រំលឹកឡើងវិញ **NORMAL**
- ✓ អាចចំណាយពេលច្រើនខែបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការមករដូវ និងត្រឡប់ទៅមានផ្ទៃពោះវិញបន្ទាប់ពីឈប់ប្រើថ្នាំចាក់។
- ✓ ប្រសិនបើដៃគូរបស់អ្នកមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍ វិធីសាស្ត្រនេះនឹងបង្កើនការប្រឈមមុខខ្ពស់នៃការឆ្លងមេរោគអេដស៍។ ត្រូវប្រើស្រោមអនាម័យ បន្ថែមលើមធ្យោបាយនេះដើម្បីការពារការឆ្លងមេរោគអេដស៍។
- ✓ ប្រសិនបើអ្នកមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការណាត់ជួបនៅបីខែបន្ទាប់ សូមប្រញាប់ត្រឡប់មកជួបតាមតែអាចធ្វើបាន អ្នកអាចនឹងចាក់ថ្នាំឡើងវិញ។

3Ws: ឲ្យអតិថិជននិយាយសារឡើងវិញមុនពេលចេញទៅផ្ទះ :

តើអ្វីដែលត្រូវធ្វើ ?	<ul style="list-style-type: none"> • ប្រើស្រោមអនាម័យពេញលេញប្រសិនបើគាត់មិនបានដាក់កងក្រោមស្បែកក្នុងចន្លោះពីថ្ងៃទី១ដល់ទី៧នៃវដ្តឈាមរដូវ។
អ្វីខ្លះដែលរំពឹងទុកថានឹងអាចកើតមានឡើង	<ul style="list-style-type: none"> • មានការប្រែប្រួលការធ្លាក់ឈាមរដូវ អាចពន្យារពេលមកឈាមរដូវ មានឈាមរដូវមិនទៀងទាត់ ធ្លាក់ឈាមញឹកញាប់ បាត់ឈាមរដូវ • ការមានរដូវ និងការវិលត្រឡប់មករកភាពមានកូនវិញ អាចមានរយៈពេលច្រើនខែក្រោយពីឈប់ចាក់ថ្នាំ
ពេលណាត្រូវត្រឡប់មកវិញ	<ul style="list-style-type: none"> • រៀងរាល់៣ខែម្តងដើម្បីចាក់ថ្នាំសារជាថ្មី (២ខែសម្រាប់ Net-En) • ពេលដែលអ្នកចង់សាកសួរសំណួរ មានការព្រួយបារម្ភ ឬ ចង់ផ្លាស់ប្តូរមធ្យោបាយពន្យារកំណើតផ្សេងទៀត • ប្រសិនបើអ្នកមានកើតឡើងបញ្ហាសុខភាព • ប្រសិនបើអ្នកសង្ស័យថាមានផ្ទៃពោះ

ការចងចាំ :

- ✓ ប្រសិនបើមិនអាចកំណត់បានថាស្រ្តីអត់មានផ្ទៃពោះទេ ផ្តល់មធ្យោបាយពន្យារកំណើតនិងធ្វើការណាត់ជួប៤សប្តាហ៍ក្រោយ
- ✓ ធ្វើការវាយតម្លៃ សាកសួរ និងពិនិត្យលក្ខខណ្ឌវេជ្ជសាស្ត្រអតិថិជន

ការធ្វើផែនការ :

- តើនាងនឹងគួរចងចាំរបៀបណាដើម្បីឲ្យដឹងថាដល់ពេលមកចាក់ថ្នាំជាថ្មី ?
- តើនាងគួរធ្វើដូចម្តេចដើម្បីធានាថាបានរៀបចំសម្រាប់ការធ្លាក់ឈាមដែលមិនបានរំពឹងទុក

ថ្នាំគ្រាប់ពន្យារកំណើត



ល្អណាស់សម្រាប់អ្នកដែលចង់បាន៖

មានកូនវិញបន្ទាប់ពីឈប់លេខ
ងាយស្រួលចាប់ផ្តើម / ឈប់ប្រើ
មានរដូវតិច

ល្អសម្រាប់អ្នកដែលចង់បាន៖

ការពារការមានផ្ទៃពោះបើប្រើត្រឹមត្រូវ
ទៀងទាត់ពេលវេលា
ចំណាយថវិកាតិច
មានភាពឯកជន
មានផលរំខានតិចតួច

មិនល្អសម្រាប់អ្នកដែលចង់បាន៖

ងាយស្រួលប្រើ
ការពារការឆ្លងមេរោគអេដស៍
និងជំងឺកាមរោគ

ថ្នាំគ្រាប់ពន្យារកំណើត
ការពារខ្ញុំពីការមានផ្ទៃពោះ!



ជាជម្រើសល្អណាស់ប្រសិនបើអ្នក៖

ចង់បានរដូវតិច
និងមកតាមការរំពឹងទុក

មិនល្អសម្រាប់អ្នកប្រសិនបើ៖

ភ្លេចភ្លាំងច្រើន ឬ
មិនចូលចិត្តការប្រើ
រៀងរាល់ថ្ងៃ

ថ្នាំគ្រាប់ពន្យារកំណើត

3Ws: ឲ្យអតិថិជននិយាយសារឡើងវិញមុនពេលចេញទៅផ្ទះ :

<p>តើអ្វីដែលត្រូវធ្វើ ?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • អ្នកត្រូវលេបថ្នាំគ្រាប់រៀងរាល់ថ្ងៃទៀងទាត់ដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព ទោះបីជាអ្នកមិនបានរួមភេទក៏ដោយ។ • ប្រសិនបើអ្នកភ្លេចលេបថ្នាំមួយគ្រាប់ លេបមួយគ្រាប់វិញភ្លាមពេលនឹកឃើញ។ • ប្រសិនបើអ្នកភ្លេចលេបថ្នាំនេះ៣គ្រាប់ឡើងទៅក្នុងសប្តាហ៍ទី១ រួមទាំងចាប់ផ្តើមលេបបន្ទះថ្នាំថ្មីយកពេល ហើយគាត់បានរួមភេទក្នុងកំឡុង៥ថ្ងៃមុននោះ ស្ត្រីត្រូវលេបថ្នាំការពារកំណើតបន្ទាន់ និងប្រើស្រោមអនាម័យមួយសប្តាហ៍ (រំលឹកឡើងវិញអំពីស្រោមអនាម័យ និងថ្នាំគ្រាប់ការពារកំណើតបន្ទាន់)។ • ប្រសិនបើអ្នកភ្លេចលេបថ្នាំនេះ៣គ្រាប់ឡើងទៅនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី៣ ស្ត្រីត្រូវលេបជួរគ្រាប់ថ្នាំដែលគ្មានជាតិថ្នាំ ចាប់ផ្តើមលេបបន្ទះថ្មីនៅចុងសប្តាហ៍ទី៣។ • ប្រសិនបើអ្នកមិនបានចាប់ផ្តើមលេបថ្នាំគ្រាប់បន្ទះដំបូងកំឡុង៧ថ្ងៃនៃវដ្តឈាមដូរ ត្រូវប្រើស្រោមអនាម័យរយៈពេល៧ថ្ងៃ។
<p>អ្វីខ្លះដែលរំពឹងទុកថានឹងអាចកើតមានឡើង</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ធ្លាក់ឈាមតិចតួចចន្លោះវដ្តឈាមដូរ កើតមាន២ទៅ៣ខែដំបូង • ផលរំខានផ្សេងទៀតដូចជា អាចឈឺក្បាលតិចតួច ចង់ក្អក ឬចង្កោរ អាចបាត់ទៅវិញ២ទៅ៣ខែក្រោយ។
<p>ពេលណាត្រូវត្រឡប់មកវិញ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • មុនពេលលេបថ្នាំអស់ពីបន្ទះ ទៅយកបន្ទះថ្នាំថ្មីសម្រាប់លេបបន្ត • ពេលដែលអ្នកចង់សាកសួរសំណួរ មានការព្រួយបារម្ភ ឬ ចង់ផ្លាស់ប្តូរមធ្យោបាយពន្យារកំណើតផ្សេងទៀត • ប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថា ACHES: ឈឺពោះឈឺទ្រូង ឈឺក្បាល បញ្ហាភ្នែក, ឈឺកំភួនជើងខ្លាំង • ប្រសិនបើអ្នកសង្ស័យថាមានផ្ទៃពោះ

ការចងចាំ :

- ✓ ប្រសិនបើមិនអាចកំណត់បានថាស្ត្រីអត់មានផ្ទៃពោះទេ ផ្តល់មធ្យោបាយពន្យារកំណើត និងធ្វើការណាត់ជួប៤សប្តាហ៍ក្រោយ
- ✓ ធ្វើការវាយតម្លៃសាកសួរ និងពិនិត្យលក្ខខណ្ឌវេជ្ជសាស្ត្រអតិថិជន

ការធ្វើវេនការ :

- តើនាងនឹងគួរចងចាំរបៀបណាដើម្បីឲ្យដឹងថាលេបថ្នាំទៀងទាត់រៀងរាល់ថ្ងៃ ?
- តើនាងគួរទៅរកថ្នាំការពារកំណើតបន្ទាន់នៅទីណា ប្រសិនបើនាងភ្លេចលេបថ្នាំ

ស្រោមអនាម័យ



ល្អណាស់សម្រាប់អ្នកដែលចង់បាន៖

ការពារការឆ្លងមេរោគអេដស៍ និងជំងឺកាមរោគ

មានកូនវិញភ្លាមបន្ទាប់ពីឈប់ប្រើ

ងាយស្រួលចាប់ផ្តើម/ឈប់ប្រើ

មានផលរំខានតិច

ល្អសម្រាប់អ្នកដែលចង់បាន៖

ការពារការមានផ្ទៃពោះបើប្រើត្រឹមត្រូវ

ចំណាយថវិកាតិច


មិនល្អសម្រាប់អ្នកដែលចង់បាន៖

ដៃគូមិនចង់ប្រើ

ភាពជាឯកជន

មានរដូវតិច

ស្រោមអនាម័យធ្វើឲ្យពួកយើងមានអារម្មណ៍ថាបានការពារខ្លួន!



ជាដម្រើសណាស់ប្រសិនបើអ្នក៖

ចង់ការពារការឆ្លងមេរោគអេដស៍និងជំងឺកាមរោគផ្សេងទៀត

មិនល្អសម្រាប់អ្នកប្រសិនបើ៖

ដៃគូរបស់អ្នកមិនប្រើជាដៀងរាល់ពេលរួមភេទ-បន្ទាប់មកអ្នកត្រូវប្រើមធ្យោបាយបម្រុងណាមួយ

ស្រោមអនាម័យ

3Ws: ឲ្យអតិថិជននិយាយសារឡើងវិញមុនពេលចេញទៅផ្ទះ :

<p>តើអ្វីដែលត្រូវធ្វើ ?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • យកម្រាមដៃពីរប្រដាប់ចុងស្រោមអនាម័យហើយរមៀលចុះក្រោមពីក្បាលលើផ្ទៃដែលឡើងរឹង • ប្រើស្រោមអនាម័យថ្មីជានិច្ចរៀងរាល់ពេលរួមភេទ។ • ប្រើស្រោមអនាម័យតែមួយរាល់ពេលរួមភេទម្តង។ • ទឹកអិលអាចការពារការរំលោភ ប៉ុន្តែទឹកអិលដែលមានជាតិប្រេងអាចបំផ្លាញស្រោម។ • ប្រើថ្នាំការពារកំណើតបន្ទាន់ប្រសិនបើស្រោមរំលោភ ឬមិនបានប្រើវា។ • ឲ្យអតិថិជនអនុវត្តន៍ការពាក់ស្រោមអនាម័យលើលើផ្ទៃគំរូ។
<p>អ្វីខ្លះដែលរំពឹងទុកថានឹងអាចកើតមានឡើង</p>	<ul style="list-style-type: none"> • គ្មានផលវិបាក
<p>ពេលណាត្រូវត្រឡប់មកវិញ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការស្រោមទៀត • ពេលដែលអ្នកចង់សាកសួរសំណួរ មានការព្រួយបារម្ភ ឬចង់ផ្លាស់ប្តូរមធ្យោបាយពន្យារកំណើតផ្សេងទៀត • ប្រសិនបើអ្នកសង្ស័យថាមានផ្ទៃពោះ

ការចងចាំ :

- ✓ ប្រសិនបើមិនអាចកំណត់បានថាស្រ្តីអត់មានផ្ទៃពោះទេ ផ្តល់មធ្យោបាយពន្យារកំណើត និងធ្វើការណាត់ជួប៤សប្តាហ៍ក្រោយ

ការធ្វើផែនការ :

- តើនាងនឹងគួរចរចាបែបណាជាមួយដៃគូក្នុងការប្រើស្រោមអនាម័យ ?
- តើនាងនឹងទុកស្រោមនៅកន្លែងណាដើម្បីងាយមានប្រើស្រាប់ពេលត្រូវការ ?

ថ្នាំគ្រាប់ការពារកំណើតបន្ទាង់



<p>ល្អណាស់សម្រាប់អ្នកដែលចង់បាន៖</p>	<p>មានផ្ទៃពោះវិញ បន្ទាប់ពីឈប់លេប ភាពជាឯកជន ងាយស្រួលចាប់ផ្តើម/ឈប់ប្រើ</p>
<p>ល្អសម្រាប់អ្នកដែលចង់បាន៖</p>	<p>ការពារការមានផ្ទៃពោះ (ប្រសិនបើអ្នកទទួលបាន៧២ម៉ោងបន្ទាប់ពីរួមភេទដោយមិនបានការពារ) ងាយស្រួលប្រើ មានផលរំខានតិចតួច</p>
<p>មិនល្អសម្រាប់អ្នកដែលចង់បាន៖</p>	<p>ការពារការឆ្លងមេរោគអេដស៍ និងជំងឺកាមរោគ ចំណាយថវិកាតិច មានរដូវតិច</p>

ថ្នាំគ្រាប់ការពារកំណើតបន្ទាង់ បានធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាធូរស្រាល!



<p>ជាដម្រើសល្អណាស់ប្រសិនបើអ្នក៖</p>	<p>ប្រសិនបើអ្នករួមភេទដោយមិនបានការពារកំឡុងពេល៣ថ្ងៃ</p>
<p>មិនល្អសម្រាប់អ្នកប្រសិនបើ៖</p>	<p>ជាបញ្ហាធំប្រសិនបើអ្នកកំពុងមានផ្ទៃពោះព្រោះមិនមានប្រសិទ្ធភាពដូចមធ្យោបាយផ្សេងទេ</p>

ថ្នាំគ្រាប់ការពារកំណើតបន្ទាន់

សារគន្លឹះសំខាន់មុនពេលជ្រើសរើស៖

- ✓ ថ្នាំគ្រាប់ការពារកំណើតបន្ទាន់មានប្រសិទ្ធភាពកំឡុងពេល៧២ម៉ោងបន្ទាប់ពីរួមភេទដោយមិនបានការពារ ប៉ុន្តែបើអ្នកប្រើវាកាន់តែឆាប់ នោះប្រសិទ្ធភាពវាកាន់តែខ្ពស់។
- ✓ ថ្នាំគ្រាប់ការពារកំណើតបន្ទាន់ មិនមែនជាឱសថសម្រាប់រំលូតកូននោះទេ។ វាមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេប្រសិនបើអ្នកមានផ្ទៃពោះរួចទៅហើយ។ ថ្នាំនេះមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ទារកទេ។
- ✓ ការប្រើថ្នាំគ្រាប់ការពារកំណើតបន្ទាន់ញឹកញាប់ វានឹងមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេ។ មិនមានបញ្ហាអ្វីទេនៅពេលដែលអ្នកប្រើច្រើនដងនៅកំឡុងពេលមួយរយៈកាលមួយរយៈកាលដោយ។ ទោះយ៉ាងណាថ្នាំគ្រាប់ការពារកំណើតបន្ទាន់មានប្រសិទ្ធភាពទាបជាងមធ្យោបាយពន្យារកំណើតផ្សេងទៀត។
- ✓ ប្រសិនបើអ្នកប្រើថ្នាំគ្រាប់ការពារកំណើតបន្ទាន់ជាប្រចាំ សូមពិចារណាប្រើប្រាស់មធ្យោបាយពន្យារកំណើតផ្សេងទៀតដែលមានប្រសិទ្ធភាពនឹងតម្លៃសមរម្យ។

3Ws: ឲ្យអតិថិជននិយាយសារឡើងវិញមុនពេលចេញទៅផ្ទះ :

តើអ្វីដែលត្រូវធ្វើ ?	<ul style="list-style-type: none"> • លេបថ្នាំគ្រាប់ការពារកំណើតកូនបន្ទាន់ភ្លាមក្នុងកំឡុងពេល ៧២ម៉ោង ឬ៣ថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានការរួមភេទដែលមិនបានការពារ។ • ប្រសិនបើអ្នកមានកូនក្នុងកំឡុងពេល២២ម៉ោងបន្ទាប់ពីលេបថ្នាំលេបថ្នាំមួយកំរិតដូសទៀត។
អ្វីខ្លះដែលរំពឹងទុកថានឹងអាចកើតមានឡើង	<ul style="list-style-type: none"> • អាចក្អកឬចង្ការ • អាចធ្លាក់ឈាមមិនទៀងទាត់ អាចធ្លាក់ឈាមដូរមុន ឬយឺត
ពេលណាត្រូវត្រឡប់មកវិញ	<ul style="list-style-type: none"> • ពេលដែលអ្នកចង់សាកសួរសំណួរ មានការព្រួយបារម្ភ ឬ ចង់ផ្លាស់ប្តូរមធ្យោបាយពន្យារកំណើតផ្សេងទៀត។ • ប្រសិនបើអ្នកសង្ស័យថាមានផ្ទៃពោះ

ការចងចាំ :

- ✓ កងដាក់ក្នុងស្បូនអាចប្រើជាមធ្យោបាយការពារកំណើតបន្ទាន់កំឡុងពេល៧២ម៉ោង ឬលើសពីនេះ បន្ទាប់ពីមានការរួមភេទមិនបានការពារ មានប្រសិទ្ធភាពជាងថ្នាំគ្រាប់។


ការធ្វើផែនការ :

- តើនាងនឹងទុកថ្នាំគ្រាប់ការពារកំណើតកូននៅកន្លែងណាដើម្បីងាយមានប្រើស្រាប់ពេលត្រូវការ ?
- តើពេលណាដែលនាងអាចលេបថ្នាំការពារកំណើតបន្ទាន់ទៀត ?

ស្រ្តីក្រោយសម្រាល បំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយ

ប្រគល់ពេល

បុរស ឆ្នាំគ្រាប់ ភី អូ ភី



សំគាល់: មេរោគបាញ់បំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយគឺជាមេរោគបាញ់បំបៅកូនប្រសិទ្ធភាពក្នុងកំឡុងពេលខែដំបូងក្រោយសម្រាល ប្រសិនបើម្តាយបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយខ្លួនឯងតែមួយមុខគត់ (គ្មានបន្ថែមអាហារអ្វីក្រៅពីទឹកដោះម្តាយ) ឲ្យបានញឹកញាប់ ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃយ៉ាងតិច៤ដងក្នុង១ថ្ងៃ និងម្តាយមិនទាន់មានឈាមរដូវក្រោយពេលសម្រាលកូនរួច។

ក្រោយស្លុត



ចាប់ផ្តើមប្រើដូចម្តេចដែលប្រើក្នុងផ្នែកពោះត្រីមាសទី១ ឬទី២ ឬគ្រប់ពេល។



ចាប់ផ្តើមប្រើដូចម្តេចដែលប្រើក្នុងផ្នែកពោះត្រីមាសទី១ ឬទី២ មិនមានពេល ជាក់លាក់ និងស្តេកស្តាតដោយការប្រមូលសម្ភារៈស្បូនដោយប្រើឧបករណ៍ ប្រមូលដោយដៃ ឬដោយប្រើខ្លីទិស និងការថែទាំការលូតមិនស្អាតដោយ ប្រើមីសូបូសូល។



សម្រាប់ស្ត្រី៖ ការចោះចងនៃស្បូន ក្រោយស្តេកស្តាត អាចពន្យារពេល ប្រសិនបើមានការបង្កពាត ធ្លាក់ឈាមខ្លាំង រហូសស្បូន ឬ ឈាមហូរផ្តុំ ក្នុងស្បូនស្រូបស្រាវ។

សម្រាប់បុរស៖ គ្រប់ពេល

ព័ត៌មានជាតិស្តីពីការព្យាបាលជំងឺក្រហមស្រស់ប្រើថ្នាំគ្រាប់មានជាតិអ៊ីដ្រូក្លូរូសម្រាប់ជំងឺអ៊ីដ្រូក្លូរូសលម្អិត ឬ អ៊ីស្ត

លម្អិត (✓) ក្នុងប្រអប់យើងធ្វើតាមការណែនាំដែលពួកជល់ចប់		ចាស់	IS
១	កំពុងកើតជំងឺថ្លើម (ស្បែក ក្អែកលឿង) រួចសព្វហាមឱសថ		
២	ជំងឺដោះខ្លួនសម្ពាធនា		
៣	អាណាធាតុ ឬរលាស់ធាតុនេះ និងកំណត់		
៤	សរសៃឈាមខ្លាញ់ នៅជំងឺហើមរាង		
៥	មានសំណាញ់ឈាមលើសពី ១៥០/៩០mmHg ឬលើសនេះ		
៦	ឈឺក្បាលខ្លាំង (ជំងឺក្បាលរាង) (ជំងឺក្បាលរាង)		
៧	ជំងឺរលាស់ធាតុនេះខ្លាំងខ្លួនធុរ		
៨	កំពុងព្យាបាលជាយូរឬថ្មីប្រើប្រាស់ការប្រកាច់ ឬថ្នាំបេង (Rifampicin) (Rifabutin)		
៩	ជំងឺនិរន្តរ៍ចាត់		
ប្រើថ្នាំ (១៩) គ្រាប់ស្រស់ខ្លួនអាស៊ែន → ថ្នាំគ្រាប់នេត្រាមីកា OK/EVA, Marvalon(COC) គ្រាប់ខ្លួនប្រើខ្លួនអាស៊ែននានា			

ថ្នាំចាក់ (DMIPA) កងដាក់គ្រាប់ស្រស់មានជំងឺអ៊ីដ្រូក្លូរូសស្រស់ស្រាយស្រស់ដាក់ក្នុងថ្លើម (TC4-IUD)

១	កំពុងកើតជំងឺថ្លើម (ស្បែក ក្អែកលឿង) រួចសព្វហាមឱសថ		
២	ធ្លាប់មានឬកំពុងមានសរសៃឈាមខ្លាញ់នៅក្នុងក្បាល		
៣	ជំងឺដោះខ្លួនសម្ពាធនា		
៤	កំពុងប្រើប្រាស់ថ្នាំប្រឆាំងការប្រកាច់ ឬថ្នាំ Rifampicin ឬ Rifabutin		
៥	មានសំណាញ់ឈាមលើសពី ១៦០/១០០mmHg		
៦	មានប្រព្រឹក្សាប្រកាច់ធាតុនេះខ្លាំងខ្លួនធុរ		
៧	ធ្លាក់ឈាមខ្លួនសម្ពាធនា		
ប្រើថ្នាំ (១៩) គ្រាប់ស្រស់ខ្លួនអាស៊ែន → ថ្នាំគ្រាប់នេត្រាមីកា OK/EVA, Marvalon(COC) គ្រាប់ខ្លួនប្រើខ្លួនអាស៊ែននានា			

លម្អិត (✓) ក្នុងប្រអប់យើងធ្វើតាមការណែនាំដែលពួកជល់ចប់		ចាស់	IS
ប្រើថ្នាំ (១៩) គ្រាប់ស្រស់ខ្លួនអាស៊ែន	១ កើតលឿងជំងឺថ្លើមខ្លួនធុរ		
	២ ឈាមកកកក្នុងសរសៃជំងឺជំងឺ (សរសៃជំងឺជំងឺធុរនៅក្នុងក្បាល) ឬស្បែក		
	៣ មានជំងឺដោះខ្លួនសម្ពាធនា		
	៤ មានធ្លាក់ឈាមកម្រិតខ្លាំងខ្លួនធុរ		
ប្រើថ្នាំ (១៩) គ្រាប់ស្រស់ខ្លួនអាស៊ែន → ប្រើថ្នាំ (១៩) គ្រាប់ស្រស់ខ្លួនអាស៊ែននានា			




លម្អិត (✓) ក្នុងប្រអប់យើងធ្វើតាមការណែនាំដែលពួកជល់ចប់		ចាស់	IS
ប្រើថ្នាំ (១៩) គ្រាប់ស្រស់ខ្លួនអាស៊ែន	១.១ មានគភ៌		
	១.២ មានជំងឺថ្លើមខ្លួនធុរ		
	១.៣ ធ្លាប់សម្រាលកូនចេញពីជំងឺជំងឺ (សរសៃជំងឺជំងឺធុរនៅក្នុងក្បាល)		
	១.៤ មានជំងឺដោះខ្លួនសម្ពាធនា		
	១.៥ មានជំងឺអេស៊ីស៊ីនខ្លាំងខ្លួនធុរ ហើយមានស្ថានភាពស្រាកស្រាយ មុនមិនល្អ		
	១.៦ មានការប្រកាច់ធាតុនេះខ្លាំងខ្លួនធុរ (Gonorrhea) និង ក្រាមីស៊ីយ៉ា		
	១.៧ មានការស្រាវជ្រាវ		
	១.៨ សំណាញ់ឈាមលើសពី ១៦០/១០០mmHg		
	១.៩ មានធ្លាក់ឈាមកម្រិតខ្លាំងខ្លួនធុរ		
	២.០ រលាកក្នុងក្បាល/ជំងឺរលាកក្បាល		
ប្រើថ្នាំ (១៩) គ្រាប់ស្រស់ខ្លួនអាស៊ែន → កងដាក់គ្រាប់ស្រស់មានជំងឺអ៊ីដ្រូក្លូរូសស្រស់ស្រាយស្រស់ដាក់ក្នុងថ្លើម			

ការគ្រប់គ្រងការធ្លាក់ឈាម

ការត្រួតពិនិត្យ	មធ្យោបាយ	ការគ្រប់គ្រង
<p>ធ្លាក់ឈាមខ្លាំង អុសសន្ធឹម ឬធ្លាក់ឈាមមិនឡើងទាក់</p> <ul style="list-style-type: none"> ធ្លាក់ឈាមខ្លាំង អុសសន្ធឹមឬធ្លាក់ឈាមមិនឡើង ទាក់ទងនឹងការឈាមមិនច្រកច្រាមទុកនិងធ្លាក់ឈាមខ្លាំងជាច្រើនបានចំពោះដោយសារការធ្លាក់ឈាមក្រោយសម្រាល និងក្រោយការព្យាបាលកូនកន្ត្រាក់ ឈាមរម្ងៅ។ ផ្តល់ផ្លូវគោលនិយមព្រះស្រី។ សម្រាប់ការបញ្ជាក់និងវាយតម្លៃជាមួយសម្រាប់ត្រូវក្រោយសម្រាលកូន ផ្តល់ការប្រឹក្សានៅពេលការធ្លាក់ឈាមដែលអាចកើតឡើង នៅពេលដែលអាមេតូប៊ីន កាបូរីបេដាម៉ា កូនកសំខាន់ផង។ 	<p>ស៊ី អុ ស៊ី / ភី អុ ភី</p>	<p>កាត់ឈាមមិនឡើងទាក់នៅពន្លាះដុំឈាមរម្ងៅជាញឹកញាប់អាចកើតមានឡើងក្នុងករណីពេលពេលខ្លះ និងអាចមានទាក់ទងនឹងការដែលខ្លាចខ្លាចរបបថ្នាំ</p> <ul style="list-style-type: none"> ពេទ្យប្រើស្រ្តីថាជាមនុស្សចាស់និងមានភាពប្រឈមខ្លាំងធ្លាក់ឈាមក្រោយ និងអាចកាត់ឈាមដែលដំបូងៗពេលជាព្រឹក្សាជាដើម។ ពេទ្យចិញ្ចឹមកូនក្តីត្រូវត្រួតពិនិត្យឈាមជាញឹកញាប់ និងកុំខ្លាចខ្លាចស្រាល។ ប្រសិនបើស្រ្តីមានការប្រើប្រាស់ថ្នាំប្រឆាំងមេរោគអេសអេស៊ីប៊ីយ៉ូស៊ីត ឬមានផ្ទុកសាប៊ូច្រាមពេលវេលាវេជ្ជប្រឹក្សាផ្ទាល់ខ្លួន។ ប្រសិនបើស្រ្តីពុំមានការប្រើប្រាស់ថ្នាំប្រឆាំងមេរោគអេសអេស៊ីប៊ីយ៉ូស៊ីត ឬមានផ្ទុកសាប៊ូច្រាមពេលវេលាវេជ្ជប្រឹក្សាផ្ទាល់ខ្លួន។ ប្រសិនបើស្រ្តីពុំមានការប្រើប្រាស់ថ្នាំប្រឆាំងមេរោគអេសអេស៊ីប៊ីយ៉ូស៊ីត ឬមានផ្ទុកសាប៊ូច្រាមពេលវេលាវេជ្ជប្រឹក្សាផ្ទាល់ខ្លួន។
<ul style="list-style-type: none"> ការប្រហូរឈាមធ្ងន់ធ្ងរឬមិនធម្មតាក៏អាចជាសញ្ញានៃពាក់ស្រី ដូចម្តេចតែងតែបញ្ជាក់ដោយការកើនឡើងនៃការធ្លាក់ឈាមក្នុងរយៈពេលមួយខែ។ ប្រសិនបើស្រ្តីមានការធ្លាក់ឈាមក្នុងរយៈពេលមួយខែនៅតែបន្ត ដែលជាលទ្ធផលបញ្ហាការឱ្យមានសញ្ញាស្រាវស្រាយទូទៅ ឧទាហរណ៍ស្លឹកស្លាំងកាកែនឱ្យឃើញ ពិចារណាពីការផ្លាស់ប្តូរមធ្យោបាយជាមួយនិងការយល់ព្រមរបស់ស្រ្តី។ ប្រសិនបើស្រ្តីមានការធ្លាក់ឈាមជាញឹកញាប់ ព្យាបាលការប្រហូរឈាមទូទៅ៖ 	<p>មធ្យោបាយផ្សេងទៀត</p>	<p>ថ្នាំចាក់ ជាញឹកញាប់អាចកើតមានឡើងក្នុងករណីពេលពេលខ្លះ និងអាចមានទាក់ទងនឹងការដែលខ្លាចខ្លាចរបបថ្នាំ</p> <ul style="list-style-type: none"> ពេទ្យប្រើស្រ្តីថាជាមនុស្សចាស់និងមានភាពប្រឈមខ្លាំងធ្លាក់ឈាមក្រោយ និងអាចកាត់ឈាមដែលដំបូងៗពេលជាព្រឹក្សាជាដើម។ ពេទ្យចិញ្ចឹមកូនក្តីត្រូវត្រួតពិនិត្យឈាមជាញឹកញាប់ និងកុំខ្លាចខ្លាចស្រាល។ ប្រសិនបើស្រ្តីពុំមានការប្រើប្រាស់ថ្នាំប្រឆាំងមេរោគអេសអេស៊ីប៊ីយ៉ូស៊ីត ឬមានផ្ទុកសាប៊ូច្រាមពេលវេលាវេជ្ជប្រឹក្សាផ្ទាល់ខ្លួន។ ប្រសិនបើស្រ្តីពុំមានការប្រើប្រាស់ថ្នាំប្រឆាំងមេរោគអេសអេស៊ីប៊ីយ៉ូស៊ីត ឬមានផ្ទុកសាប៊ូច្រាមពេលវេលាវេជ្ជប្រឹក្សាផ្ទាល់ខ្លួន។
<ul style="list-style-type: none"> បញ្ហាដែលបណ្តាលមកពីការធ្លាក់ឈាម ពិនិត្យផលិតផល PSL <p>ចាក់ឈាមរម្ងៅ</p>	<p>ថ្នាំចាក់</p>	<p>ថ្នាំចាក់ ជាញឹកញាប់អាចកើតមានឡើងក្នុងករណីពេលពេលខ្លះ និងអាចមានទាក់ទងនឹងការដែលខ្លាចខ្លាចរបបថ្នាំ</p> <ul style="list-style-type: none"> ពេទ្យប្រើស្រ្តីថាជាមនុស្សចាស់និងមានភាពប្រឈមខ្លាំងធ្លាក់ឈាមក្រោយ និងអាចកាត់ឈាមដែលដំបូងៗពេលជាព្រឹក្សាជាដើម។ ពេទ្យចិញ្ចឹមកូនក្តីត្រូវត្រួតពិនិត្យឈាមជាញឹកញាប់ និងកុំខ្លាចខ្លាចស្រាល។ ប្រសិនបើស្រ្តីពុំមានការប្រើប្រាស់ថ្នាំប្រឆាំងមេរោគអេសអេស៊ីប៊ីយ៉ូស៊ីត ឬមានផ្ទុកសាប៊ូច្រាមពេលវេលាវេជ្ជប្រឹក្សាផ្ទាល់ខ្លួន។ ប្រសិនបើស្រ្តីពុំមានការប្រើប្រាស់ថ្នាំប្រឆាំងមេរោគអេសអេស៊ីប៊ីយ៉ូស៊ីត ឬមានផ្ទុកសាប៊ូច្រាមពេលវេលាវេជ្ជប្រឹក្សាផ្ទាល់ខ្លួន។

តើត្រូវប្រាកដថាអតិថិជនមិនមានផ្ទៃពោះតាមរបៀបណា: ប្រវត្តិអតិថិជន

សាកសួរសំណួរអតិថិជនពី១ដល់៦ ។ នៅពេលដែលនាងឆ្លើយ (ចាស) នូវសំណួរណាមួយ បញ្ឈប់ការសួរ និងធ្វើតាមការណែនាំ។

	សូមគូស (✓) ក្នុងប្រអប់ហើយធ្វើតាមការណែនាំពីដើមរហូតដល់ចប់	ចាស	IS
៖យាងផ្លូវគោលលក្ខណៈស្រស់ស្អាត	តើផ្លូវចុងក្រោយរបស់អ្នកបានចាប់ផ្តើមមានក្នុងកំឡុងពេលត្រឹមត្រូវ (ឬក៏ក្នុង១ខែត្រឹមត្រូវ) ប្រសិនបើអ្នកមានផែនការប្រើកងដាក់ក្នុងស្បូន) ដែរឬទេ?		
	តើអ្នកមានកូនតូចអាយុតិចជាង៦ខែកំពុងបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយពេញលេញ ឬជិតពេញលេញ និងមិនទាន់មានឈាមផ្លូវនាវាឡើយ ចាប់តាំងពីអ្នកសម្រាលកូនដែរឬទេ?		
	តើអ្នកតម្រូវអាចតាំងពីអ្នកមានឈាមផ្លូវលើកចុងក្រោយ ឬតាំងពីសម្រាលកូនរួចដែរឬទេ?		
	តើអ្នកទើបសម្រាលកូនហើយបាន៤សប្តាហ៍ដែរឬទេ?		
	តើអ្នកមានវល្លភ័យល្អក្នុងរយៈពេលពេលត្រឹមត្រូវ (ឬក៏ក្នុង១ខែត្រឹមត្រូវ) ប្រសិនបើអ្នកមានផែនការប្រើកងដាក់ក្នុងស្បូន) ដែរឬទេ?		
	តើអ្នកកំពុងប្រើមធ្យោបាយពន្យារកំណើតជាប់លាប់ និងត្រឹមត្រូវដែរឬទេ?		
			
	គ្មានសញ្ញានៃការមានផ្ទៃពោះទេ	ឆ្លើយ (ចាស) ១ ឬច្រើនហើយ	ឆ្លើយ "ទេ" ទាំងអស់
	អ្នកអាចផ្តល់មធ្យោបាយពន្យារកំណើតអាមេរិកាតិថិជនបាន	ឈប់: ការមានផ្ទៃពោះមិនអាចដាច់ចោលបានទេអតិថិជនគួរដាក់ការមានឈាមផ្លូវបន្ទាប់បន្ទួនប្រសិនបើមានសញ្ញាផ្សេងៗទៀត។	

ប្រសិនបើអតិថិជន ឆ្លើយទេ គ្រប់សំណួរទាំងអស់, ការមានផ្ទៃពោះមិនអាចដាច់ចោលបានទេតាមរយៈការប្រើប័ណ្ណសំណួរ។

ប្រសិនបើអតិថិជនឆ្លើយចាសយ៉ាងហោចណាស់សំណួរមួយ ហេតុផលនេះ បញ្ជាក់ថាគ្មានផ្ទៃពោះ។

Adapted with permission from FHI 360.



