




# ក្រសួងសុខាភិបាល

# ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះ ត្រីមាតថ្លៃពោះ និង ជំងឺហ្សិកា

## ក. កើតបំណងចង់ដឹងអោយបានការរក្សាគង់ជំងឺហ្សិកា?

- ប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាស៊ាន
- ទ្វីបអាមេរិក
- ប្រទេសមួយចំនួននៅតំបន់អាមេរិកកណ្តាល
- ប្រទេសមួយចំនួននៅតំបន់កោះក្នុងសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក
- ទ្វីបអាហ្វ្រិក

## ខ. ផលប៉ះពាល់ជំងឺហ្សិកាដល់ត្រីមាតថ្លៃពោះ



- វាអាចឆ្លងពីម្តាយទៅទារកក្នុងផ្ទៃ
- ការឆ្លងជំងឺហ្សិកាទៅត្រីមាតថ្លៃពោះធ្វើឱ្យការលូតលាស់របស់ទារកមានភាពមិនប្រក្រតីដូចជា ទារកមានក្បាលតូច ឧបទ្វីក្បាល និងប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទ
- វាឆ្លងតាមខ្នាតងារឆ្លងជាប្រភេទសត្វមូសខ្លា ដែលដូចគ្នាទៅនឹងជំងឺគ្រុនឈាម មូសប្រភេទនេះ ទាំយ៉ាងសាហាវនៅពេលថ្ងៃ ហើយវាក៏រកទំនាក់ទំនងយប់ផងដែរ
- ឆ្លងតាមការរួមភេទជាមួយដៃគូដែលមានផ្ទុកវីរុសហ្សិកា
- គ្មានផ្លូវព្យាបាល និងគ្មានវ៉ាក់សាំងចាក់ការពារនៅឡើយ

## គ. រោគសញ្ញា

ភាគច្រើននៃអ្នកកើតជំងឺនេះប្រហែល ៧០% ទៅ ៨០% ពុំមានស្នែងចេញជា រោគសញ្ញាអ្វីទាំងអស់។ រោគសញ្ញាដែលអាចកើតមានដូចជា:

- ក្តៅខ្លួន
- រោគសញ្ញាលើស្បែក (ដូចជាស្នាមគ្រហមរួចលើស្បែក)
- ឈឺសាច់ដុំ និងសន្លាក់ដៃជើង
- ភ្នែកឡើងគ្រហម (រលាក Conjunctive ភ្នែក)
- រោគសញ្ញាបន្ទាប់មក៖
  - អស់កម្លាំង
  - ឈឺក្បាល
  - វិបត្តិផ្លូវវិលាមអាហារ (រាក ចូក)



## ឃ. ប្រសិនបើអ្នកចាំបាច់ត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ដែលមានការរក្សាគង់ជំងឺហ្សិកា

- ត្រូវធ្វើការពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យជំនាញ
- ស្វែងរកព័ត៌មានតាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទរហ័សរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល លេខ ៖ ☎ 115




## ង. វិធីបង្ការ

- បំបាត់ដំប្រកមូសខ្លា ដោយធ្វើអនាម័យជុំវិញផ្ទះ ការពារកុំឱ្យមានទឹកដក់នៅជុំវិញផ្ទះ លុបបំបាត់ផ្ទុកសំបកកំប៉ុង សំបកកង់ខ្លាន និងប្រើអាប៊ែតដាក់ក្នុងពាង ឬរាងស្តុកទឹក
- ស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ឱ្យជិតខ្លួនប្រាណ និងមានពណ៌ខ្លី
- ប្រើផ្លូវបាញ់ (Spray) ឬលាប (Repellent) កុំឱ្យមូសមកជិត (ត្រីមាតថ្លៃពោះអាចប្រើបាន ដោយមានសុវត្ថិភាព ពុំមានផលប៉ះពាល់ទេ)
- សម្រាកក្នុងមុងរាល់ពេល (យប់ និងថ្ងៃ) ព្រមទាំងបើកបន្ទប់ឱ្យដំ ដើម្បីឱ្យត្រីមាតថ្លៃពោះដេកបានល្អប្រសើរ
- ជៀសវាងការរួមភេទជាមួយដៃគូដែលមានផ្ទុកវីរុសហ្សិកា ឬត្រូវប្រើស្រោមអនាម័យគ្រប់ពេលរួមភេទ

ត្រីមាតថ្លៃពោះ និង ត្រីមាតដែលមានគម្រោងមានថ្លៃពោះ គួរត្រូវជៀសវាងធ្វើដំណើរទៅតំបន់ដែលមានការរក្សាគង់ជំងឺហ្សិកា







# ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគួរយល់ដឹង



- \* វិរុសហ្សិកាឆ្លងពីម្តាយទៅទារកក្នុងផ្ទៃ
- \* ការឆ្លងវិរុសហ្សិកាទៅស្ត្រីមានផ្ទៃពោះធ្វើឱ្យការលូតលាស់របស់ទារកមានភាពមិនប្រក្រតីដូចជា : ទារកមានក្បាលតូច ខួរខ្នងក្បាល និងប្រព័ន្ធស្វែប្រសាទ
- \* ជំងឺហ្សិកាអាចឆ្លងតាមការរួមភេទជាមួយអ្នកដែលមានផ្ទុកវិរុសហ្សិកា ពីព្រោះវិរុសនេះមាននៅក្នុង ទឹកកាម ឈាម ទឹកនោម ទឹកភ្លោះ ទឹកមាត់ ព្រមទាំងសារធាតុរាវរាងកាយ នៅក្នុងខួរក្បាលនិងខួរផ្ចឹងខ្នង គ្មានថ្នាំព្យាបាល និងគ្មានវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ការពារទេ

## ការពារខ្លួនអ្នកពីវិរុស ហ្សិកា



ម្តងប្រភេទនេះខាំយ៉ាងសាហាវ នៅពេលថ្ងៃ ហើយវាក៏អាចខាំ នៅពេលយប់ផងដែរ



ប្រើថ្នាំបាញ់ ឬលាប កុំឱ្យមូសមកជិត (ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះអាច ប្រើបានពុំមានផលប៉ះពាល់ទេ)



ស្លៀកសំលៀកបំពាក់ ឱ្យជិតខ្លួនប្រាណ និងមានពណ៌ភ្លឺ



ជៀសវាងការរួមភេទជាមួយ ដៃគូដែលមានផ្ទុកវិរុសហ្សិកា ត្រូវប្រើស្រោមអនាម័យរាល់ ពេលរួមភេទ



ការពារពីមូសខាំ ដោយសម្រាវ ក្នុងមុខរាល់ពេល (ថ្ងៃ និងយប់)។ បើកបង្អួចឱ្យធំ ដើម្បីឱ្យពន្លឺថ្ងៃ និងខ្យល់ចេញចូលគ្រប់គ្រាន់ បំបាត់ជម្រកមូសខ្លាមូសជាដាក់ អាបែត លាងពាង ឬអាងទឹក លុបចូកទឹកដក់ សំអាតលំនៅដ្ឋាន



\* សូមស្វែងរកព័ត៌មានតាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទរហ័សរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលលេខ : ១១៥

